

ব্রেন স্ট্রোকের দু'ঘন্টার মধ্যে অত্যাধুনিক চিকিৎসা করে রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করছে NNC

‘স্ট্রোক’ শব্দটির সঙ্গে বর্তমানে প্রায় প্রত্যেকেই ওয়াকিবহাল।

• ইন্সট্রিমিক স্ট্রোক - মস্তিষ্কের রক্তবাহী নালীর মধ্যে রক্তের ডেলা (ক্লট) জমে রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় যার ফলে এই স্ট্রোক হয়ে থাকে। এটি দু'ধরনের হয় -

১) Thrombotic Stroke বা Cerebral Thrombosis

২) Embolic Stroke বা Cerebral Embolism

• হেমারেজিক স্ট্রোক - মস্তিষ্কের দুর্বল রক্তবাহী নালী চাপে ছিড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ ঘটলে এই স্ট্রোক হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ। Aneurysms ও Arteriovenous Malformations (AVMs) এই

স্ট্রোকের প্রকারভেদ।

• ট্রান্সিয়েন্ট ইন্সট্রিমিক স্ট্রোক (TIS)- মস্তিষ্কে সৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী ক্লটের প্রভাবে এটি হয় যার ফলে স্বল্প সময়ের জন্য হাত-পা দুর্বল হয় আবার ঠিক হয়ে যায়। তাই একে “Mini Stroke”ও বলে।

স্ট্রোকের উপসর্গ - মুখ বেঁকে যাওয়া ও কথা জড়িয়ে যাওয়া, শরীরের এক দিক অসাড় হয়ে যাওয়া, অস্বচ্ছ দৃষ্টি ও ডাবল ভিশন ইত্যাদি।

স্ট্রোকের কারণ - উচ্চরক্তচাপ, ব্লাড সুগার, কোলেস্টেরল, ধূমপান, মদ্যপান, অতিরিক্ত ওজন ইত্যাদি। শনাক্তকরণ - সাধারণত এম আর আই, সিটি স্ক্যান এবং সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম।

বিশেষ প্রতিনিধি

চিকিৎসা - কতক্ষণ আগে রোগীর স্ট্রোক হয়েছে এবং তার শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে এই রোগের চিকিৎসা করা হয় • স্ট্রোক হওয়ার ৩-৪ ঘন্টার মধ্যে রোগীকে IVtPA ইনজেকশন দিলে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে পারে • ক্লট বড় হলে স্ট্রোক হওয়ার ৮ ঘন্টার মধ্যে সার্জারি করলে আশাপ্রদ ফল মেলে।

মতর্কতা - প্রতিদিন কার্যিক পরিশ্রম এবং সঠিক ডায়েট • পরিবারের স্ট্রোকের ইতিহাস থাকলে নির্দিষ্ট বয়সের পরে নিয়মিত পরীক্ষা করানো • TIS এর লক্ষণ দেখলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করা • রোগীর

প্যারালাইসিসের সম্ভাবনা থাকলে রিহাবের প্রয়োজন।

NATIONAL NEUROSCIENCES CENTRE, CALCUTTA (A Joint Association of NF Bengal & Peerless Hospital), Peerless Hospital Campus, 360, Panchasayar, Kol-94, Opp. - Hiland Park,

Phone : 9007737999 / 9231991849 / 033 2432 0777 / 0999 / 0748,

Email: nncalcutta@gmail.com, Website : www.nncalcutta.com